



## L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶活性检测试剂盒 Gal LDH Assay Kit

分光光度法

产品编号: AK515V

产品规格: 50T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
AK515-A	50mL×1 瓶	4℃保存;
AK515-B	粉剂×1 瓶	4℃保存; 临用前加入 40mL 蒸馏水, 充分溶解。
AK515-C	粉剂×1 瓶	4℃保存; 临用前加入 5mL 蒸馏水, 充分溶解。

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

### 简介:

**意义:** L-半乳糖途径是合成抗坏血酸 (AsA) 的主要途径。L-半乳糖酸-1,4-内酯脱氢酶 (L-galactono-1,4-lactone dehydrogenase, Gal LDH) 位于线粒体内膜, 负责催化植物体内 AsA 生物合成的最后一步, 也是该途径的关键酶之一, 对植物体内 AsA 含量的积累起着至关重要的作用。

**原理:** Gal LDH 催化 L-半乳糖内酯还原细胞色素 c (Cyt c), 还原型 Cyt c 在 550nm 有吸收峰; 测定还原型 Cyt c 增加速率, 来计算 Gal LDH 活性。

### 自备用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

### 粗酶液提取:

- 按照组织质量 (g) : AK515-A 体积 (mL) 为 1 : 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL AK515-A) 进行冰浴匀浆。13000g, 4℃离心 10min, 取上清置冰上待测。

### 测定步骤:

- 分光光度计预热 30 min, 调节波长到 550nm, 蒸馏水调零。
- AK515-B 在 25℃水浴锅中预热 30 min。
- 在 1mL 玻璃比色皿中依次加入下列试剂:

试剂名称	测定管 (ul)
上清液	100
AK515-B	800
AK515-C	100
迅速混匀后于 550nm 比色, 记录 10s 和 130s 的吸光值 A1 和 A2, $\Delta A = A2 - A1$ 。	

### Gal LDH 活性计算公式:

- 按样本蛋白浓度计算

活性单位定义: 25℃中每毫克蛋白每分钟还原 1nmol Cyt c 为 1 个酶活单位。

$$\text{Gal LDH (nmol/min/mg prot)} = \frac{\Delta A \div \epsilon \div d \times V \text{ 反应} \times 10^9}{(C_{\text{pr}} \times V \text{ 样}) \div T} = 289 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

- 按样本质量计算

活性单位定义: 25℃中每克样品每分钟还原 1nmol Cyt c 为 1 个酶活单位。

$$\text{Gal LDH (nmol/min/g 鲜重)} = \frac{\Delta A \div \epsilon \div d \times V \text{ 反应} \times 10^9}{(W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T} = 289 \times \Delta A \div W$$

注： $\epsilon$ ：还原型 Cyt c 摩尔消光系数， $17.3 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$ ； $d$ ：比色皿光径(cm)，1cm； $V_{\text{反总}}$ ：反应体系总体积， $1\text{ mL}=0.001 \text{ L}$ ； $10^9$ ： $1\text{ mol}=1 \times 10^9 \text{ nmol}$ ； $V_{\text{样}}$ ：加入反应体系中上清液体积， $100\mu\text{L}=0.1\text{ mL}$ ； $C_{\text{pr}}$ ：上清液蛋白浓度， $\text{mg/mL}$ ，蛋白质浓度需要另外测定，建议使用本公司蛋白质含量 BCA 试剂盒； $V_{\text{样总}}$ ：加入提取液体积，1mL； $W$ ，样本质量，g； $T$ ：反应时间，2min。

**注意事项：**

1. AK515-B 和 AK515-C 配制好后 3 天内使用完。